CANAL DEL CORAZÓN
SHAO YIN DE LA MANO



GENERALIDADES
El pequeño yin
“El emperador de la corte”

- Dirección centrífuga
- Tienen dos recorridos; uno interno y el otro externo
- Consta de 9 puntos bilaterales
- Pertenece a un órgano **YIN**
- El horario de mayor actividad energética es de las 11.00 a las 13.00 hrs.
- Maneja mucha energía y mueve a toda la sangre

RECORRIDO INTERNO DEL MERIDIANO DEL CORAZÓN

- El meridiano del Corazón nace en los vasos sanguíneos que rodean este órgano Zang.

Es decir **en el centro del Corazón**) pero sin penetrarlo, más bien apoyado en el "sostén del **Corazón**“ el pericardio (Xinbaoluo), **probablemente la aorta y otros grandes vasos** que entran y salen del **Corazón** La ruta interna del meridiano del Corazón se divide en tres ramas.

- Una primera ruta parte del nacimiento y desciende **por el diafragma hasta relacionarse con el Intestino Delgado** (órgano Fu acoplado).
- La segunda rama **asciende a lo largo del esófago y el cuello, atraviesa la cara y la mejilla para relacionarse con los tejidos que rodean el ojo.**
- La tercera rama va, **desde el Corazón al Pulmón** se dirige **hacia la axila** y **emerge a la superficie en el punto C1-Jiquan.**



SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO INTERNO

- Se presenta dolor y plenitud del tórax
- Dolor en las costillas y por debajo de ellas
- Irritabilidad, disnea, el paciente se agrava al recostarse
- Vértigo, desordenes mentales
- Irregularidades circulatorias, trastornos funcionales de los Wu Zang, Liu Fu a expensas de alteraciones del aporte sanguíneo
- Alteraciones de la memoria y la claridad mental, alucinaciones, delirios que pudieran llegar hasta la locura (manía y esquizofrenia)
- Debilidad intelectual, angor pectoris, alteraciones en la transpiración

RECORRIDO EXTERNO DEL MERIDIANO DEL CORAZÓN

- Inicia en la axila en el punto C1-Jiquan baja por el borde posterior de la cara interna del brazo hasta C3 shaohai en la cara interna del codo para continuar su descenso hasta el hueso pisiforme de la muñeca (C7-Shenmen) y continuar por la eminencia hipotenar entre el 4° y 5° metatarso rn rl punto shaofu C8 y finaliza en el punto C9-Shaochong situado en el ángulo ungueal radial del dedo meñique.



SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO EXTERNO

- Febrícula
- Cefalea
- Dolor ocular
- Dolor en la parte posterior del brazo,
- Sed y sequedad de garganta
- Palmas calientes
- Dolor a lo largo de la escápula y brazo, adormecimiento, paresias y parestesias a lo largo del trayecto del Canal, con hormigueos hasta la punta del dedo meñique

SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO EXTERNO

EXCESO

- Se encuentra cara roja, lengua seca, palpitaciones fuertes y dolorosas, pulso rápido, voz ruidosa, ojos brillantes, audacia, el paciente difícilmente es atacado por el frío, alegría en exceso.

DEFICIENCIA

- Se presenta cara y lengua pálida, palpitaciones con pulso fino y débil, respiración rápida, dolor en el ápex (punta del corazón), voz velada (incapacidad para hablar), timidez, fobias, insomnio, con muchos sueños cuando logra dormir, mala memoria, poliuria, orina clara.

SINTOMATOLOGÍA DEL CANAL LUO (C5)

- **EXCESO:** Existe plenitud, distensión en el tórax y dolor precordial.
- **DEFICIENCIA:** El paciente no puede hablar.

SINTOMATOLOGÍA DEL CANAL TENDINOMUSCULAR (C9)

- Dolor torácico interno e intenso, cuando hay patología del canal existe una masa abdominal debajo de la punta del esternón (epigastrio)
- El codo no se puede mover, ni estirar ni encoger, ya que el corazón se relaciona con el codo, así como la rodilla se relaciona con el riñón; se presenta una masa tumoral fija del tamaño del puño al nivel del ombligo (por el Síndrome de “concentración de energía” del corazón), triste, desanimado, dolor umbilical.

CANAL DEL INTESTINO DELGADO TAI YANG DE LA MANO



GENERALIDADES
el Gran Yang de Mano o Yang Supremo

- Dirección centrípeta
- Tienen dos recorridos; uno interno y el otro externo
- Consta de 19 puntos bilaterales
- Pertenece a una viscera **YANG**
- El horario de mayor actividad energética es de las 13.00 a las 15.00 hrs.
- Maneja en igual proporción sangre y energía

RECORRIDO EXTERNO DEL MERIDIANO DEL INTESTINO DELGADO

- Se origina en el ángulo ungueal externo del meñique (ID1-Shaoze), pasa por el dorso de la mano y sigue por el lado externo del borde posterior del antebrazo; pasando el olecranon, sube a la escápula y se reúne con el meridiano Du en el punto Du14-Dazhui. Des de aquí se dirige a la fosa supraclavicular (E12-Quepen) y se une al Corazón.
- Desde la fosa supraclavicular asciende por el cuello hasta llegar a la mejilla ID18-Quanliao. En este punto el meridiano se bifurca:



RECORRIDO EXTERNO DEL MERIDIANO DEL INTESTINO DELGADO

- Una rama se dirige hacia V1-Jingming, en el canto interno del ojo donde se conecta con el meridiano de la Vejiga.
- Una segunda rama parte de ID18-Quanliao dirigiéndose al canto externo del ojo (punto VB1- Tongziliao) y de allí se dirige hacia la oreja penetrando en el oido en el punto ID19-Tinggong.



SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO EXTERNO

- Adormecimiento de la boca y la lengua
- Dolor del cuello y la mejilla
- Garganta dolorosa
- Contractura del cuello
- Dolor en el borde lateral del brazo y hombro posterior.

RECORRIDO INTERNO DEL MERIDIANO DEL INTESTINO DELGADO

- En el Punto E12-Quepen el meridiano se interioriza y una rama desciende a lo largo del esófago, atraviesa el diafragma y penetra en el Estómago, continuando su camino hasta llegar al Intestino Delgado.

- Según el Beijing Ling Shu otra rama interna llega hasta el punto E39-Xiajuxu (punto He-Mar inferior del Intestino Delgado).



SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO INTERNO

- Dolor y distensión del bajo vientre que se extiende alrededor de la cintura y los genitales
- Diarrea
- Dolor abdominal acompañado de constipación y heces secas

SINTOMATOLOGÍA DEL CANAL LUO (ID7)

- **EXCESO:** Articulaciones relajadas, el codo está atrofiado existe dificultad para moverlo, se presenta el síndrome del codo del tensita.

- **DEFICIENCIA:** Vesículas en la piel, alteraciones dermatológicas (forúnculos y pústulas).

SINTOMATOLOGÍA DEL CANAL TENDINOMUSCULAR (ID1)

- Dolor en el trayecto del canal desde el meñique hasta la epitróclea
- Dolor en el centro de la axila
- Contractura y dolor de la escápula
- Dolor en la mejilla y en el oído con tinitus
- El paciente necesita cerrar los ojos para aclarar su vista
- Dolor en el cuello de carácter intenso (La influencia hacia el cuello es muy importante), edema de cuello, inflamación causada por un traumatismo o infección, acompañado de temperatura local.